

## دراسة التغيرات المرضية لكيس المرارة في العجول الواردة إلى مجزرة الموصل

كرم هاشم الملاح، صموئيل أوشغنا يوخنا، مؤيد ياسين المشهداني و رمضان طاهر الريكانى

فرع الأمراض، كلية الطب البيطري، جامعة الموصل، الموصل، العراق

(الاستلام ١٣ كانون الثاني ٢٠٠٨؛ القبول ٢ تموز ٢٠٠٨)

### الخلاصة

تم جمع (٨٥) عينة كيس مرارة من العجول الواردة إلى مجزرة الموصل بعد ذبحها مباشرة وأجري عليها الفحص المرضي العياني والنسجي للتحري عن وجود الآفات المرضية فيها حيث ظهرت في العينات مجموعة من الآفات المرضية التي تم تشخيصها شملت الالتئاب الليفي في (٨.٢%) من العدد الكلي من العينات والورم الليفي في (١.١%) من العينات ولوحظ وجود حصى المرارة بنسبة (٢.٣%) وحالة التخضب بالبيليروبين بنسبة (١.١%) ولوحظت التشوّهات الخلقية متمثلة بكيس المرارة المزدوج بنسبة (١.١%) ولوحظت إضطرابات النمو متمثلة بفرط التسنج الظهاري بنسبة (١٤.١%) كما ظهرت إضطرابات الأيض الخلوي ممثلة بالانحراف الجلطي في (١.١%) من العينات المفحوصة أما إضطرابات الدوران فتمثلت بوجود فرط الدم بنسبة (٢٠%) والانزفقة الحبرية بنسبة (٧%) وحالة تصلب الشرايين العصيدي بنسبة (١.١%) من العدد الكلي للعينات المفحوصة.

### Pathological study of gall bladder lesions in calves slaughtered at Mosul slaughter house

K. H. Al-Mallah, S. O. Youkhana, M. Y. Al-Mashhadani and R. T. Al-Rekani

Department of Pathology, College of Veterinary Medicine, University of Mosul, Mosul, Iraq

### Abstract

Eighty five samples of complete unopened gall bladder were collected from calves immediately after slaughtering at Mosul slaughter house for detection of any pathological lesions that might be present through gross and histopathological examinations. These examinations revealed various pathological changes which included lymphocytic inflammation (8.2%), fibroma (1.1%), gall stones (2.3%), bilirubin pigmentation (1.1%), congenital deformities (1.1%) appeared as Y shape gall bladder, growth disturbances manifested by hyperplasia (14.1%), coagulative necrosis as a metabolic disturbance (1.1%), hyperemia (20%), petechial hemorrhage (7%) and atherosclerosis (1.1%) of the total samples.

عوامل خمجية متنوعة مسببة التهاب كيس المرارة Cholecystitis أو عن تغيرات ايضية كالتي تسبب تكون حصى المرارة Cholelithiasis بالإضافة إلى الأورام والتشوّهات الخلقية وبالرغم من ان امراض كيس المرارة تحظى باهتمام كبير في مجال الطب البشري وتعتبر شائعة (٣) فإن العكس تماما هو الشائع في مجال الطب البيطري فيما يتعلق بهذا التركيب عند حيوانات المزرعة والتي يعتبر اكتشاف وتشخيص الآفات المرضية فيه نادراً بسبب عدم وجود دلالات سريرية مميزة لها

### المقدمة

يعتبر كيس المرارة من الاعضاء الحشوية المرتبطة بالكبد (١) والذي يعمل كمخزن للعصارة الصفاء ذات الاهمية الهضمية المعروفة حيث يتم إمتصاص الماء وتركيز العصارة ثم إفرازها إلى الأثنى عشرى بقناة مشتركة مع البنكرياس (٢) وبسبب هذه الوظيفة ولموقعه التشريحي فإن له اهمية كبيرة من الناحية السريرية عند تعرضه للإصابة المرضية التي قد تنتج عن

الليفي Fibroma بنسبة ١١,١% من العينات المفحوصة ظهر عيانياً ككتلة صلبة ذات لون أخضر مزراق بينما تميزت بوجود كتلة نسيجية حاوية على حزم الألياف الكولاجينية مع إنتشار متوسط للأرومات الليفية Fibroblast صورة (٣). لقد أظهر الفحص العياني وجود عدة قطع من الحصى صغيرة الحجم ذات لون أسود وحافات ناثنة مع بثورات سوداء وصفراء ذات ملمس خشن على لغشاء المخاطي لكيس المراة في عيتيتين فقط بنسبة ٢,٣% من عينات المفحوصة صورة (٤). وتمثلت نسجياً بوجود فرط الدم والارتشاح اللمفي وفرط التنسج وانسلاخ الظهارة وانزفة، ولوحظ من الفحص العياني وجود حالة واحدة من التشوهات الخلقية تمثلت بكيس المراة المزدوج حيث ظهر الكيس مشطوراً إلى فصين ينتهي كل منها بتركيب كيسى مغلقاً وتم وضعها في إكياس بلاستيكية منفصلة وترقيمهما مع البيانات الخاصة بكل عينة من صاحب الحيوان وحفظت متلاجة في داخل علب بلاستيكية لنقلها للمختبر.

تم إجراء الفحص المرضي العياني مباشرة بعد وصول العينات وسجلت التغيرات المرضية العيانية الملاحظة مع تصويرها وتم اخذ عينات وضعت في محلول الفورمالين الداري المتعادل لغرض إجراء الفحص المرضي النسجي.

تم معاملة العينات المحفوظة بالفورمالين حيث تم نقطيعها إلى قطع صغيرة بحجم ١ سم<sup>٣</sup> ثم أجريت عليها عملية التمرير بالكحولات والزاييلول والشمع وحضرت منها قوالب شمعية ثم قطعت بجهاز المشراح إلى شرائح نسيجية بسمك ٤ - ٦ مايكرون وثم صبغها بالصبغة الروتينية الهيماتوكسيلين والإيوزين Haematoxylin and Eosin (٥). ثم فحست تحت المجهر الضوئي وتم تسجيل التغيرات المرضية النسجية.

### النتائج

من خلال إستعراض الجدول (١) أظهر الفحص المرضي العياني والنسجي لـ ٨٥ عينة وجود تغيرات مرضية في ٢٦ عينة في حين لم تظهر تغيرات مرضية في ٥٩ عينة كانت سليمة عيانياً ونسجياً شملت هذه التغيرات المرضية ظهور الالتهاب اللمفي في سبع عينات بنسبة ٨,٢% المفحوصة تمثل بوجود فرط الدم في الاوعية الدموية مع ارتشاح وتجمع نصحة التهابية متكونة بصورة أساسية من الخلايا اللمفية في الطبقة تحت المخاطية لجدار كيس المراة صورة (١). مع وجود انزفة خفيفة وتتوسف للظهور في بعض المناطق. تمثل ظهور الارام بتشخيص حالة واحدة من الورم

(٤) بالإضافة إلى قلة الاهتمام بهذا العضو للاستهلاك البشري ولهذه الاسباب ولندرة الدراسات المرضية حول هذا الموضوع في مكتبتنا العراقية والعربي فقد صممنا دراستنا الحالية للتحري عن الافات المرضية لكيس المراة في العجل الواردة إلى مجزرة الموصل.

### المواد وطرق العمل

#### جمع العينات

جمعت ٨٥ عينة من عجل ذكور تراوح اعمارها بين ١-٢,٥ سنة بعد ذبحها مباشرة خلال خمسة أيام في شهر تشرين الأول عام ٢٠٠٦ تمثلت العينة بكيس المراة كاملاً غير مفتوحاً وتم وضعها في إكياس بلاستيكية منفصلة وترقيمهما مع البيانات الخاصة بكل عينة من صاحب الحيوان وحفظت متلاجة في داخل علب بلاستيكية لنقلها للمختبر.

#### الفحص المرضي العياني

تم إجراء الفحص المرضي العياني مباشرة بعد وصول العينات وسجلت التغيرات المرضية العيانية الملاحظة مع تصويرها وتم اخذ عينات وضعت في محلول الفورمالين الداري المتعادل لغرض إجراء الفحص المرضي النسجي.

#### الفحص المرضي النسجي


تم معاملة العينات المحفوظة بالفورمالين حيث تم نقطيعها إلى قطع صغيرة بحجم ١ سم<sup>٣</sup> ثم أجريت عليها عملية التمرير بالكحولات والزاييلول والشمع وحضرت منها قوالب شمعية ثم قطعت بجهاز المشراح إلى شرائح نسيجية بسمك ٤ - ٦ مايكرون وثم صبغها بالصبغة الروتينية الهيماتوكليلين والإيوزين Haematoxylin and Eosin (٥). ثم فحست تحت المجهر الضوئي وتم تسجيل التغيرات المرضية النسجية.

جدول (١) : النسب المئوية لحدوث الافات المرضية في كيس المرارة للعجوش.


نوع الافة المرضية	تصنيف الافة	الحاوية على الافة	عدد العينات الحاوية على الحالات المصابة	النسبة المئوية لظهور الافة	النسبة المئوية لظهور الافة ضمن العدد الكلي للعينات المفحوصة
الالتهاب	الالتهاب الملمفي	الحالات المصابة	٧	%٢٦,٩	%٨,٢
الاورام	الورم الليفي	الحالات المصابة	١	%٣,٨	%١.
حصى المرارة والبلورات	----	الحالات المصابة	٢	%٦.	%٢,٣
الخضاب (التخضب)	التخضب بالبيليروبين	الحالات المصابة	١	%٣,٨	%١,١
الشوهدات الخلقية	كيس المرارة المزدوج	الحالات المصابة	١	%٣,٨	%١,١
اضطرابات النمو	فرط التنسج الظهاري	الحالات المصابة	١٢	%٤٦	%١٤,١
اضطرابات الايضية	النخر التجلطي للظهارة	الحالات المصابة	١	%٣,٨	%١,١
اضطرابات الدوران	فرط الدم	الحالات المصابة	١٧	%٦٥	%٢٠
الانزفة الحبرية	الانزفة الحبرية	الحالات المصابة	٦	%٢٣	%٧
تصلب الشريان العصيدي	تصلب الشريان العصيدي	الحالات المصابة	١	%٣,٨	%١,١

المجموع الكلي للعينات المصابة بنوع معين من الافات لا يمثل العدد الكلي للعينات المظهرة للتغيرات المرضية بسبب ظهور أكثر من نوع من الافات في العينات


العدد الكلي للعينات المفحوصة = ٨٥ عينة  
العدد الكلي للعينات المصابة = ٢٦ عينة  
النسبة المئوية لظهور التغيرات المرضية ضمن العدد الكلي للعينات المفحوصة = %٣٠,٥




صورة ١: مقطع في جدار كيس المرارة يوضح فرط الدم في الاوعية الدموية (A) وارتشاح وتجمع نصفة التهابية من الخلايا اللمفية في الطبقة تحت المخاطية لجدار كيس المرارة (B). الصبغة E & H . قوة التكبير X٥٦.




صورة ٢: مقطع في جدار كيس المرارة يوضح وجود انزفة متفرقة في الطبقة الظهارية وتحت الظهارية (A) مع توسيف وإنسلاخ الظهارة (B)، الصبغة H & E. قوة التكبير  $\times ٥٦$ .




صورة ٣: مقطع في كتلة الورم الليفي في جدار كيس المرارة يوضح حزم الألياف الكولاجينية المتوجة (A). والانتشار متوسط الكثافة للأرومات الليبية (B)، الصبغة H & E. قوة التكبير  $\times ٦٠$ .




صورة ٤: كيس المرارة مفتوح يحوي على ٣ قطع حسى صغيرة الحجم (A) وإنبعاث بثورات على السطح المخاطي المحتقن للكيس .(B)




صورة ٥: كيس المرارة المزدوج يحتوي على فصين (A) وينتهي كل منها بزوابئ كيسية مغلقة (B).




صورة ٦: توضح كيسى مرارة للعجول مفتوحين. الكيس على اليسار يظهر حالة اليرقان الشديد او تخضب بالبيلروبين مع تلون الغشاء المخاطي بالالوان الاخضر والاحمر والاحمر والبني (A) على اليمين كيس مرارة طبيعي (B).




صورة ٧: وجود نخر تجلطي على الغشاء المخاطي لكيس المرارة يظهر بشكل أصفر مخضر (A) ويحاط باحتقانات شديد (B) مع ظهور الغشاء المخاطي بشكل حبيبي.



صورة ٨: توضح كيس المرارة يتصل بجزء من الاثنى عشر يلاحظ وجود انزفة حبرية متعدد على الغشاء المخاطي لكيس المرار على اليمين (A) مع علامات التهاب الامعاء الشديد على اليسار (B).



صورة ٩: مقطع عرضي في شريان في جدار كيس المراراة لعجل يوضح تطور حالة تصلب الشرايين العصيدي يتميز بفرط التنسج للخلايا العضلية الملساء (A) وظهور الخلايا الرغوية (B) وإرتشاح خلايا التهابية في جدار الشرايين (C) وجود الشقوق الدهنية الشبيهة بالابر بالطبقة تحت البطانة الشريانية، الصبغة E & H . قوة التكبير X ٤٣٠.



صورة ١٠: مقطع طولي لشريان في جدار كيس المرارة لعجل يوضح تطور حالة تصلب الشريان العصيدي تتميز بتخن جدار الشريان (A) وتضيق الجوف الشرياني (B) وظهور الخلايا الرغوية الحاوية على الفجوات الدهنية (C) وارتشاح الخلايا الالتهابية (D). الصبغة E & H. قوة التكبير ٣٧٠ X.

الانتقالية في تكوين هذا النوع من الحصى كما أشار الباحثون (٨) أن إفراز الجذور الحرة يلعب دوراً أيضاً في تكوين بلورات الكوليستروول وبالتالي حصى المرارة الكوليستروولي Cholesterol gallstone وعادة ما يكون السائل الصفراوي على المحتوى بهذا المركب لطرحه خارج الجسم وقد يكون هناك تداخل آخر بين الحالتين حيث أن التهاب جدار كيس المرارة قد يؤدي إلى السكون الصفراوي Cholestasis بسبب إضعاف قدرة العضلات الملساء لكيس المرارة على التقلص مستقبلات البروستاكلاندين وذلك بسبب قلة استجابة Decrease gallbladder ejection مسبباً تلف الغشاء الذي تحدثه الجذور الحرة الناتجة من الالتهاب في هذه الخلايا (٩). كما أن سكون المرارة يعتبر عاملاً مهماً في ترسب البلورات وتطور حصى المرارة (١٠). كذلك فإن تجمع مادة المخاطين Mucin المفرزة طبيعياً في تجويف المرارة لنفس السبب يعتبر عامل خطورة لتطوير الحصى من حيث إحتوائها على مرکبات غنية بالسيستين والتي تعتبر مستقبلات لارتباط البيليروبين والكوليستروول ودهون الصفراء الأخرى (١١). وربما يكون سكون المرارة لفترة طويلة مسؤولاً عن لتخضب باليليروبين في الغشاء المخاطي للمرارة كما أن ذلك قد ينتج عن حصول اليرقان الذي يظهر جهازياً ليشمل كافة أنسجة الجسم.

#### المناقشة

أوضحت الدراسة ان الالتهابات في كيس المرارة Cholecystitis قد ظهرت بنسبة ٨,٢% من العينات المفحوصة وانها جميعاً صفت كالتهابات لمفيية تتبع لنوع النضحة الحاوية على الخلايا اللمفية بشكل اساسي حيث أن هذا النوع من الالتهاب غالباً ما يكون من النوع المزمن وهذا يشابه ما ذكره الباحث (٦) من ان النوع المزمن من الالتهابات هو الأكثر شيوعاً في كيس المرارة عند البشر وأن شدة الالتهاب يعتمد على كثافة ارتشاح الخلايا اللمفية وعلى تغيرات ظهارة المخاطية، إن ظهور الالتهابات اللمفية المزمنة نسبياً في العينات التي لوحظ فيها تطور حصى وبلورات الصفراء قد تكون بسبب وجود علاقة مباشرة بين حدوث الالتهاب وتكوين حصى حيث ذكر الباحثون (٦) ان إلتهاب كيس المرارة يؤدي إلى إفراز الجذور الحرة في جدار كيس المرارة والعصارة الصفراء والتي تزيد بدورها من تكوين حصى المرارة وهذا ما يؤيده الباحثون (٧) من أن زيادة نشاط الجذور الحرة في الصفراء يزيد من تكون حصى المرارة الصبغي Pigment gallstone أو حصى المرارة البيليروبيني Bilirubin gallstone والذي يتكون أساساً من بيليروبينات الصوديوم Sodium bilirubinate من حيث الدور الذي تلعبه المعادن

## شكر وتقدير

تم دعم البحث من قبل كلية الطب البيطري، جامعة الموصل

## المصادر

١. الشيخي، عبد القادر جاسم. أطلس التشريح البيطري العملي. الطبعة الأولى. مطبعة جامعة الموصل ١٩٨٥: ٣٣٠.
٢. ذنون، خير الدين محي الدين، يوسف، وليد حميد. علم الفسلجة البيطري. الطبعة الأولى. مطبعة جامعة الموصل ١٩٨٧: ٣٥٠ - ٣٥١.
3. Kumar V, Cotran D, Robins MD. Basic Pathology. 6<sup>th</sup> ed. Philadelphia: WB Saunders Comp 1997.
4. Durando MM. Disease of biliary system. J Am Vet Med Assoc 1995; 206: 1018-1020.
5. Luna LG. Manual of histologic staining methods of the armed forces institute of pathology. 34<sup>th</sup> ed. New York: Mc Graw-Hill book Comp 1968.
6. Sipos P, Krisztina H, Blazovics A, Feher J. Cholecystitis, gallstones and free radical reactions in human gall bladder. Med Sci Monit 2001; 7: 84-88.
7. Shen T, Lin C, Yang Z. Presence of free radicals in pigment gall stone in vivo. Chinese Med J 1996; 109: 446-449.
8. Eder IM, Miquel JF, Jungst D. Reactive oxygen metabolites promot cholesterol crystal formation in model bile: Role of lipid peroxidation. Free Rad Biol Med 1996; 20: 743-749.
9. Liang Xiao Z, Chen Q, Piero B, Behar J. Abnormalities of gallbladder muscle associated with acute inflammation in guinea pigs. Am J Physiol Gastrointest liver Physiol 2001; 281: 490-497.
10. Portincasa P, Van Erpecum KJ, Van Berge-Henegouwen GP. Cholesterol crystallization in bile. Gut 1997; 41: 138-141.
11. Nunes Dp, Keates AC, Afdhal NH, Offiner GD. Bovine gall-bladder mucin contains two distinct tandem repeating sequences: evidence for scavenger receptor cysteine-rich repeats. Biochem J 1995; 310: 41-48.
12. Cable CS, Rebhun WC, Fortier LA. Cholelithiasis and chole cystitis in a dairy cow. J Am Vet Med Assoc 1997; 211: 899-900.
13. Tazuma S, Kajiyama G. Carcinogenesis of malignant lesions of the gall bladder. Langenbeck's Archives of Surgery 2001; 386: 224-229.
14. Alawneh I. Double gallbladders of the Y type. Case report and review of the literature. Med Klin 1975; 70: 1559-1562.
15. Braun U, Linggi T, Pospischil A. Ultrasonographic findings in three cows with chronic ragwort (*Senecio alpinus*) Poisoning. British Vet Assoc 1999; 14: 122-126.

أن التهابات كيس المرارة في الأبقار غالباً ماتتت من الاصابات الجرثومية والتي تتسبب في معظم الاحيان بواسطة جراثيم الاشريكيا القولونية *E. Coli* ومطثيات البيرفرنجنس *Clostridium perfringens* (١٢).

لقد أظهرت النتائج أيضاً تطور الورم الليفي Fibroma بنسبة ١١,١% من العينات المفحوصة ويمكن أن يكون ذلك بمحض الصدفة كما أن بعض الاصابات الطففية كالالتهابات المزمنة وحصى المرارة وبعض الاصابات الطففية المزمنة قد تكون عامل داعم لظهور الاورام. فقد ذكر الباحثون (١٣) أن هذه الاصابات تسبب ظهور حالة الحوؤن Metaplasia في النسيج وتكون الافة السليلية Polyps والتي قد تكون نواة لتطور الاورام، إن هذه الاسباب نفسها قد تكون مسؤولة عن ظهور حالة فرط التنسج الظهاري الملاحظ في ١٤,١% من العينات المفحوصة. لقد أظهر الفحص المرضي العياني لدراستنا وجود حالة التشوّه الخلقي تمثّلت بوجود كيس المرارة المزدوج وهذا يشابه ما ذكره الباحث (١٤) من أن هناك بعض المرضى يكشف عن كونهم يحملون كيس المرارة المزدوج Double gallbladder أو كيس المرارة من النوع (Y) والذي يعتبر تشوّهاً خلقياً في التصوير الشعاعي قبل العمليات الجراحية أو أثناء الجراحة. إن ظهور النخر التجاطي بنسبة ١١,١% من العينات المفحوصة قد يكون ناتجاً عن أصابة جرثومية وإفراز الديفانات التي تسبب نخر وتوسف وإنسلاخ الخلايا الظهارية أو بسبب الجذور الحرة وربما يكون ناتجاً عن التسمم بمركبات أو نباتات سامة فمثلاً ذكر الباحثون (١٥) أن التسمم بنبات Ragwort يمكن أن يحدث النخر التجاطي وإنسلاخ الخلايا الظهارية مع الوذمة في جدار كيس المرارة والأمعاء الدقيقة وإعاقة الدورة الدموية البابية فقد لوحظ فرط الكبد أما بالنسبة لاصطربات الدورة الدموية فقد لوحظ فرط الدم في ٢٠% من العينات المفحوصة ارتبط بعضها بتغيرات التهابية كارتشاح الخلايا الالتهابية وفرط التنسج وإنسلاخ الخلايا الظهارية بينما لم يرتبط البعض الآخر بهذه التغيرات حيث ان فرط الدم يمكن ان يظهر كتغير فسلجي أيضاً أما الانزفقة الحبرية الملاحظة عيانياً ونسجياً فقد ترافقت أساساً مع التغيرات الالتهابية وهذا غالباً ما يرتبط بحدوث الاذى للخلايا البطانية للأوعية الشعرية بسبب الديفانات الجرثومية او الجذور الحرة (٣).

لقد لوحظ أيضاً تطور افة تصلب الشريان العصيدي Atherosclerosis في جدار المرارة لعينة واحدة ممثلة ١١,١% من العينات المفحوصة وربما كانت هذه الافة تعطي انعكاساً لحدث الجهد التأكسدي الشديد كنتيجة لالتهاب مزمن سابق مسبباً تحرر الجذور الحرة او تكون بسبب التسمم المزمن بأحد المركبات أو العناصر المحدثة للجهد التأكسدي والذي قد يلعب التلوث البيئي دوراً أساسياً في إحداثه.